Cómo Usar Drogas de Manera Segura

Usa Agujas Nuevas

Siempre que consuma drogas, utilice agujas y piezas nuevas, como filtros y hornillos, para evitar infecciones. Vaya a una farmacia o llame a un servicio de intercambio de jeringas para obtener suministros nuevos.



Adquiera Naloxona

La naloxona es el único medicamento que puede detener una sobredosis de opioides. Téngala a mano cada vez que consuma drogas. Puede adquirir naloxona en una farmacia o mediante un programa de intercambio de jeringas.



No Consuma Solo

No podrá administrarse la naloxona usted mismo si tiene una sobredosis. Por lo tanto, asegúrese de que haya alguien con usted que pueda llamar al 911 y administrarle la naloxona en una emergencia.



Diríjase a una Clínica o Visite un Médico

Inyectarse drogas puede causar infecciones que pueden enfermarlo. **Visite al médico o diríjase a un centro de salud al menos una vez al año** para someterse a pruebas de hepatitis C y VIH, o para recibir atención de las heridas que no mejoran.



Todos tenemos un rol fundamental para terminar con el conflicto de las sobredosis. ¿Cuál es el suyo? Descúbralo en **PreventOverdoseRI.org**



.

Usa Agujas Nuevas

Siempre que consuma drogas, utilice agujas y piezas nuevas, como filtros y hornillos, para evitar infecciones. Vaya a una farmacia o llame a un servicio de intercambio de jeringas para obtener suministros nuevos.

Cómo Usar Drogas de Manera Segura



Adquiera Naloxona

La naloxona es el único medicamento que puede detener una sobredosis de opioides. Téngala a mano cada vez que consuma drogas. Puede adquirir naloxona en una farmacia o mediante un programa de intercambio de jeringas.



No Consuma Solo

No podrá administrarse la naloxona usted mismo si tiene una sobredosis. Por lo tanto, asegúrese de que haya alguien con usted que pueda llamar al 911 y administrarle la naloxona en una emergencia.



Diríjase a una Clínica o Visite un Médico

Inyectarse drogas puede causar infecciones que pueden enfermarlo. **Visite al médico o diríjase a un centro de salud al menos una vez al año** para someterse a pruebas de hepatitis C y VIH, o para recibir atención de las heridas que no mejoran.



Todos tenemos un rol fundamental para terminar con el conflicto de las sobredosis. ¿Cuál es el suyo? Descúbralo en **PreventOverdoseRI.org** PREVENT RICH

Cómo Usar Drogas de Manera Segura

Usa Agujas Nuevas

Siempre que consuma drogas, utilice agujas y piezas nuevas, como filtros y hornillos, para evitar infecciones. Vaya a una farmacia o llame a un servicio de intercambio de jeringas para obtener suministros nuevos.



Adquiera Naloxona

La naloxona es el único medicamento que puede detener una sobredosis de opioides. Téngala a mano cada vez que consuma drogas. Puede adquirir naloxona en una farmacia o mediante un programa de intercambio de jeringas.



No Consuma Solo

No podrá administrarse la naloxona usted mismo si tiene una sobredosis. Por lo tanto, asegúrese de que haya alguien con usted que pueda llamar al 911 y administrarle la naloxona en una emergencia.



Diríjase a una Clínica o Visite un Médico

Inyectarse drogas puede causar infecciones que pueden enfermarlo. **Visite al médico o diríjase a un centro de salud al menos una vez al año** para someterse a pruebas de hepatitis C y VIH, o para recibir atención de las heridas que no mejoran.



Cómo Usar Drogas de Manera Segura

Usa Agujas Nuevas

Siempre que consuma drogas, utilice agujas y piezas nuevas, como filtros y hornillos, para evitar infecciones. Vaya a una farmacia o llame a un servicio de intercambio de jeringas para obtener suministros nuevos.



Adquiera Naloxona

La naloxona es el único medicamento que puede detener una sobredosis de opioides. Téngala a mano cada vez que consuma drogas. Puede adquirir naloxona en una farmacia o mediante un programa de intercambio de jeringas.



No Consuma Solo

No podrá administrarse la naloxona usted mismo si tiene una sobredosis. Por lo tanto, asegúrese de que haya alguien con usted que pueda llamar al 911 y administrarle la naloxona en una emergencia.



Diríjase a una Clínica o Visite un Médico

Inyectarse drogas puede causar infecciones que pueden enfermarlo. **Visite al médico o diríjase a un centro de salud al menos una vez al año** para someterse a pruebas de hepatitis C y VIH, o para recibir atención de las heridas que no mejoran.











Cómo Mantenerse Seguro Con Fentanilo

Usa Tiras Reactivas de Fentanilo

Las tiras reactivas de fentanilo son pruebas fáciles de usar para ver si sus medicamentos se han mezclado o cortado con fentanilo. Cuando obtenga su resultado, puede tomar la decisión sobre qué hacer a continuación.



Lleve Naloxona

Las sobredosis suceden rápido. Asegúrese de que usted o sus amigos tengan naloxona.



Usa Con Otros

Asegúrese de tener a alguien cerca. Le pueden administrar naloxona si tiene una sobredosis.



Llame al 911

Llamar al 911 Si cree que alguien está teniendo una sobredosis, llame primero al 911 y adminístrele naloxona hasta que se restablezca la respiración. La Ley del Buen Samaritano brinda cierta protección legal, ya sea que tenga con usted drogas o no.



Todos tenemos un rol fundamental para terminar con el conflicto de las sobredosis. ¿Cuál es el suyo? Descúbralo en **PreventOverdoseRI.org**



Cómo Mantenerse Seguro Con Fentanilo

Usa Tiras Reactivas de Fentanilo

Las tiras reactivas de fentanilo son pruebas fáciles de usar para ver si sus medicamentos se han mezclado o cortado con fentanilo. Cuando obtenga su resultado, puede tomar la decisión sobre qué hacer a continuación.



Lleve Naloxona

Las sobredosis suceden rápido. Asegúrese de que usted o sus amigos tengan naloxona.



Usa Con Otros

Asegúrese de tener a alguien cerca. Le pueden administrar naloxona si tiene una sobredosis.



Llame al 911

Llamar al 911 Si cree que alguien está teniendo una sobredosis, llame primero al 911 y adminístrele naloxona hasta que se restablezca la respiración. La Ley del Buen Samaritano brinda cierta protección legal, ya sea que tenga con usted drogas o no.



Todos tenemos un rol fundamental para terminar con el conflicto de las sobredosis. ¿Cuál es el suyo? Descúbralo en **PreventOverdoseRI.org**



Cómo Mantenerse Seguro Con Fentanilo

Usa Tiras Reactivas de Fentanilo

Las tiras reactivas de fentanilo son pruebas fáciles de usar para ver si sus medicamentos se han mezclado o cortado con fentanilo. Cuando obtenga su resultado, puede tomar la decisión sobre qué hacer a continuación.



Lleve Naloxona

Las sobredosis suceden rápido. Asegúrese de que usted o sus amigos tengan naloxona.



Usa Con Otros

Asegúrese de tener a alguien cerca. Le pueden administrar naloxona si tiene una sobredosis.



Llame al 911

Llamar al 911 Si cree que alguien está teniendo una sobredosis, llame primero al 911 y adminístrele naloxona hasta que se restablezca la respiración. La Ley del Buen Samaritano brinda cierta protección legal, ya sea que tenga con usted drogas o no.



Cómo Mantenerse Seguro Con Fentanilo

Usa Tiras Reactivas de Fentanilo

Las tiras reactivas de fentanilo son pruebas fáciles de usar para ver si sus medicamentos se han mezclado o cortado con fentanilo. Cuando obtenga su resultado, puede tomar la decisión sobre qué hacer a continuación.



Lleve Naloxona

Las sobredosis suceden rápido. Asegúrese de que usted o sus amigos tengan naloxona.



Usa Con Otros

Asegúrese de tener a alguien cerca. Le pueden administrar naloxona si tiene una sobredosis.



Llame al 911

Llamar al 911 Si cree que alguien está teniendo una sobredosis, llame primero al 911 y adminístrele naloxona hasta que se restablezca la respiración. La Ley del Buen Samaritano brinda cierta protección legal, ya sea que tenga con usted drogas o no.

